


हायपरथायरॉडीझम

थायरॉड ग्रंथींची अवास्तव काम करण्याची स्थिती म्हणजे काय?

जेव्हा थायरॉड संप्रेरकाची निर्मीती उच्च पातळीत होते तेव्हा थायरॉड ग्रंथींची अवास्तव काम करण्याची स्थिती निर्माण होते. थायरॉड संप्रेरक शरीराचे तापमान हवदयाची स्पंदने, वाढ आणि वजन नियंत्रित करतात.

घोक्याची कारणे-

- शरीर स्वतःच्याच पेशीजालांना प्रतिद्रव्ये निर्माण करते असे रोग उदा. थायरॉड ग्रंथी मोठी होणे - गॉयटर किंवा ग्रेव्ह डिसीज
- काही विशिष्ट औषधे उदा. लिथियम अमिओडेरॉन किंवा ॲस्परिन
- विषाणु संसर्ग
- थायरॉड ग्रंथींचा दाह किंवा कर्करोग
- आयोडिनचे प्रमाण अधिक असणे



चिन्हे आणि लक्षणे-

- वजन कमी होणे, अतिशय भूक लागणे, किंवा अतिसार किंवा बद्धकोष्ठता
- घाम जास्त येणे आणि उष्णता सहन न होणे
- अस्वस्थता, आराम न वाटणे
- थरथर वाढणे आणि शांत झोप न लागणे
- विश्रांती घेत असतांनाही हवदयाच्या स्पंदनाचा वेग वाढणे आणि वेगाने श्वास घेणे
- मानेत वेदनादायी गाठ येणे किंवा डोल्यांचे बुब्बुळ पुढे येणे
- थकवा आणि स्नायूत अस्वस्थपणा जाणवणे
- कमी किंवा मासिक पाळी न येणे

निदान-

- TSH - थायरॉड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन टेस्ट थायरॉड ग्रंथीतून स्ववणा-या संप्रेरकाच्या स्ववण्याच्या नियंत्रण दाखविणारी चाचणी
- (T3, T4) थायरॉड हार्मोन्स संख्या वाढलेले आढळतात.
- आयोडिन थायरॉड स्कॅन

उपचार-

- ॲन्टी थायरॉड औषधे थायरॉड संप्रेरक कमी पातळीत आणतात आणि लक्षणे कमी करतात.
- किरणोत्सारी, आयोडिन देऊन थायरॉड ग्रंथीतील काही पेशी मारल्या जातात, त्यामुळे थायरॉड संप्रेरक स्ववण्याचे प्रमाण कमी होते.
- शस्त्रक्रिया करून संपूर्ण थायरॉड ग्रंथी किंवा तिचा काही भाग काढला जातो.

रुग्ण समुपदेशन-

- रुग्णाच्या यकृत हानीची चिन्हे किंवा लक्षणे दिसल्यास तसेच पंडुरोग किंवा संसर्ग (ताप, डोकेदुखी, आजारी असल्यासारखे वाटणे, त्वचेवर पुराळ येणे, घसा सुजणे) यासारख्या त्रासाचा अनुभव आल्यास त्वरीत डॉक्टरांस कळवावे.
- औषधांमुळे रक्तातील शर्करेचे प्रमाण कमी झाले आहे असे दिसेल त्यामुळे मधुमेही रुग्णांनी रक्तशर्करेच्या पातळीवर लक्ष ठेवावे.
- रेडिओऑर्कटीव आयोडिन उपचारास जाण्यापूर्वी महिला रुग्ण गर्भवती नाही याची खातरजमा करावी.

Reference: Micromedex's Care Notes System Online 2.0